

新型コロナウイルスワクチンに関する説明書

問い合わせ
市健康推進課 TEL：22-0179

◆ワクチン接種について

接種は強制ではありませんので、接種を希望する人は、市のホームページやワクチンの副反応などについて記載したこの用紙などをお読みになり、医療機関に予約のうえ、予防接種を受けましょう。

令和6年度に使用する新型コロナウイルスワクチンは、令和5年度までのように厚生労働省から各自治体には配送されませんので、各医療機関等が購入し接種に使用します。また、流通量が不明のため、昨年度までのように、医療機関ごとの使用ワクチンをお知らせできませんので、必要な人は、医療機関への予約の際にご確認ください。

令和6年8月30日現在で、厚生労働省から薬事承認（申請中含む）されているワクチンは次のとおりです。

メーカー名	ファイザー(株)	モデルナ・ジャパン(株)	第一三共(株)	武田薬品工業(株)	Meiji Seikaファルマ(株)
販売名	コミナティ	スパイクバックス	ダイチロナ(薬事申請中)	ヌバキソビッド(薬事申請中)	コスタイベ(薬事申請中)
抗原株	SARS-CoV-2 オミクロン株 J N.1 系統				
ワクチンの種類	mRNA			組換えタンパク	mRNA(レプリコン)
ワクチンの添付文書(PMDA)					
釜石市内での使用歴	令和3年以降従来株、オミクロン株2価(BA.1、BA.4-5)、オミクロン株1価(XBB.1.5)	令和3年以降従来株、オミクロン株2価(BA.1、BA.4-5)、オミクロン株1価(XBB.1.5)	令和6年1月以降オミクロン株1価(XBB.1.5)	令和4年6月以降従来株	未使用

(出典：令和6年9月2日第35回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会研究開発及び生産・流通部会資料)

(出典：令和6年9月9日時点で独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)ホームページに掲載中の添付文書)

(出典：釜石市新型コロナウイルスワクチン接種実施計画)

※添付文書は薬事承認など随時更新されますので、最新のものをご覧ください。

◆ワクチンの副反応について

主な副反応は、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、mRNA ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまでに明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいはかかりつけ医に相談してください。

ごく稀ではあるものの、ワクチン接種後に心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています(※)。接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。

(※) 1回目よりも2回目の接種の後に多く、若い方、特に男性に多い傾向が見られます。

ごく稀ではあるものの、mRNA ワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。

令和6年9月9日時点で公表されている、ワクチンの添付文書に記載されている重大な副反応（ショック、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎）以外の副反応は次のとおりです。なお、添付文書は薬事承認等で随時更新されますので、最新のものをご確認ください。

メーカー名	ファイザー(株)	モデルナ・ジャパン(株)	第一三共(株)	武田薬品工業(株)	Meiji Seikaファルマ(株)
販売名	コミナティ	スパイクバックス	ダイチロナ(薬事申請中)	ヌバキソビッド(薬事申請中)	コスタイベ(薬事申請中)
局所症状	疼痛(85.6%)、腫脹(10.3%)、発赤・紅斑、そう痒感、熱感、内出血、浮腫	疼痛(88.5%)、腫脹・硬結(15.4%)、発赤・紅斑(12.9%)、遅発性反応(疼痛、腫脹、紅斑等)、そう痒感、じん麻疹	疼痛(92.1%)、熱感(43.6%)、腫脹、紅斑、そう痒感、硬結、遅発性反応(紅斑、腫脹、そう痒感、熱感、硬結、疼痛)、発疹、リンパ節腫脹	圧痛(74.4%)、疼痛(61.5%)、発赤・紅斑、腫脹・硬結、そう痒感	圧痛(92.4%)、疼痛(83.8%)、腫脹(14.0%)、硬結(12.4%)、紅斑(12.4%)、そう痒感
過敏症					発疹、過敏症、そう痒症
精神神経系	頭痛(59.4%)、浮動性めまい、嗜眠、不眠症、顔面麻痺、易刺激性、傾眠	易刺激性・泣き(77.1%)、頭痛(58.7%)、傾眠(49.9%)	頭痛(37.4%)、感覚鈍麻、傾眠	頭痛(50.1%)	頭痛(39.0%)、めまい(19.2%)、感覚鈍麻、傾眠
心・血管系					動悸
消化器	下痢(14.8%)、嘔吐、悪心、食欲減退	悪心・嘔吐(21.7%)	嘔吐・嘔気、下痢	悪心・嘔吐(14.9%)	下痢、悪心、嘔吐、腹痛、上腹部痛、軟便
代謝・栄養		食欲減退(43.8%)			
呼吸器	口腔咽頭痛、鼻閉、咳嗽				鼻漏
筋・骨格系	筋肉痛(39.1%)、関節痛(25.3%)、四肢痛、背部痛	筋肉痛(49.8%)、関節痛(35.5%)	筋肉痛、関節痛、背部痛	筋肉痛(50.7%)、関節痛(23.1%)	筋肉痛(28.8%)、関節痛(26.7%)、背部痛
皮膚	多汗症、発疹、寝汗、蕁麻疹	発疹	発疹、そう痒症	発疹、紅斑、そう痒症、じん麻疹	
血液	リンパ節症	リンパ節症(20.2%)	リンパ節症、リンパ節痛、リンパ節炎	リンパ節症	
全身症状					倦怠感(44.8%)、悪寒(30.0%)、発熱(20.0%)、異常感
感染症					咽頭炎
その他	疲労(66.0%)、悪寒(36.0%)、発熱(16.8%)、疼痛、倦怠感、無力症、インフルエンザ様症状、腋窩痛	疲労(66.8%)、悪寒(38.3%)、発熱(16.3%)、顔面腫脹	倦怠感(55.2%)、発熱(35.0%)、腋窩痛、悪寒	疲労(52.4%)、倦怠感(40.3%)、発熱、四肢痛、悪寒	

◆ 相談窓口のご案内

厚生労働省ではワクチンの有効性や安全性、施策の在り方に関するご意見など、ワクチン接種全般に関する問い合わせに対応しています。

- 厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
電話番号：0120-700-624（フリーダイヤル）
受付時間：9時から21時（土日祝も対応）

岩手県では、新型コロナワクチンの副反応を疑う症状に係る相談窓口を開設しています。

- 県民医療相談センター
電話番号：019-629-9620
受付時間：（平日）9時00分～16時00分
- いわて発熱等相談コールセンター
電話番号：0570-059-333
受付時間：（土日祝含）16時00分～9時00分

◆ 予防接種健康被害救済制度

ワクチン接種では、副反応による健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済（医療費・障害年金等の給付）が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。ご相談は市健康推進課へお願いします。